


# Niet-specifieke ontstekingen van de plasbuis

A blurred, artistic photograph of a person's back and shoulders, showing the spine and shoulder blades. The colors are warm, ranging from dark brown to light beige.

**SOAIDS**



Een plasbuisontsteking is een ontsteking van het slijmvlies aan de binnenkant van de plasbuis. De plasbuis van de man loopt van de blaas tot aan de opening in de eikel. Een ontsteking van de plasbuis wordt meestal veroorzaakt door bacteriën. Vaak gaat het om een seksueel overdraagbare aandoening (soa). Chlamydia en gonorrhoe komen het meest voor. Soms zijn er andere ziekteverwekkers in het spel. In veel gevallen lukt het niet om een precieze oorzaak van de klachten te vinden.

Om bij klachten een chlamydia- of gonorrhoe-infectie uit te sluiten, wordt daar in elk geval op getest. Als de testuitslagen na één week geen chlamydia of gonorrhoe laten zien, spreken we van een niet-specifieke plasbuisontsteking.



## Klachten

Een ontsteking van de plasbuis kan zorgen voor heldere afscheiding, pijn bij het plassen of jeuk in het uiteinde van de plasbuis.



## Mogelijke gevolgen van een plasbuisontsteking

In het algemeen geeft een plasbuisontsteking lichte klachten en zijn er geen ernstige gevolgen. Een enkele keer treedt er een bijbalontsteking op.



## Onderzoek

De diagnose wordt gesteld door laboratoriumonderzoek te doen van de urine of de afscheiding uit de plasbuis. Zijn daar ontstekingscellen in te zien, dan is er sprake van een plasbuisontsteking. Er wordt dan gezocht naar mogelijke oorzaken, zoals chlamydia of gonorrhoe. Soms wordt er een herpesinfectie of trichomonas gevonden. Als er geen duidelijke ziekteverwekkers worden gevonden, dan is de diagnose: 'niet-specifieke plasbuisontsteking'.



## Behandeling

De behandeling bestaat uit een korte antibioticakuur. Tot één week na het beëindigen van deze kuur mag iemand geen seksueel contact hebben. De antibiotica zijn werkzaam tegen de meest voorkomende verwekkers van plasbuisontstekingen, dus ook chlamydia.



## Partnerwaarschuwing

Als iemand een niet-specifieke plasbuisontsteking heeft, moeten ook al zijn sekspartner(s) uit de afgelopen vier weken worden gewaarschuwd. Die moeten worden onderzocht en ook meteen worden behandeld. In 30-60 procent van de gevallen wordt bij de vrouwelijke partners van mannen met klachten, toch nog een chlamydia-infectie gevonden.



## Controle

Als de klachten drie weken na de antibioticakuur niet zijn verbeterd of als de klachten juist toenemen, is er opnieuw contact met een huisarts of soa-polikliniek nodig. Zijn de klachten verdwenen, dan hoeft de urine niet opnieuw op bacteriën te worden onderzocht.



## Meer informatie

Meer informatie over soa's is te vinden op de website van Soa Aids Nederland. Soa Aids Nederland is het expertisecentrum op het gebied van hiv-infectie en andere soa's. Op [www.soa aids.nl](http://www.soa aids.nl) staat uitgebreide informatie over hivinfectie en andere soa's. Voor jongeren is er de informatiesite [www.sense.info](http://www.sense.info).

## Voor meer vragen over soa's, bel de Aids Soa Infolijn

0900 – 204 204 0 (0,10 ct pm)  
ma t/m wo 10.00u tot 20.00u  
do en vrij 14.00u tot 20.00u  
of mail naar: [infolijn@soa aids.nl](mailto:infolijn@soa aids.nl)

Soa Aids Nederland spant zich in om de informatie in al haar voorlichtingsmateriaal zo nauwkeurig en betrouwbaar mogelijk aan te bieden. Toch aanvaardt Soa Aids Nederland geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van het gebruik van de folder. De informatie in onze folders mag nooit worden beschouwd als vervanging van een consult of een persoonlijk bezoek aan arts of specialist.